



# Truskawki

# Program ochrony



Początek wegetacji

Przed kwitnieniem

Biały pąk

Kwitnienie

Po kwitnieniu

Między zbiorami

Po zbiorach



**Decis®**

**Decis®**  
Kwieciak malinowiec.  
5 ml środka w 10 l wody.  
Środek stosować przed kwitnieniem truskawek.

**Pomarsol® F**

**Pomarsol® F**  
Szara pleśń, biała plamistość liści.  
20 g środka w 10 l wody.  
Zabiegi przeprowadzać w czasie kwitnienia truskawek.  
Pierwsze opryskiwanie wykonać na początku kwitnienia, gdy 10% kwiatów jest w stadium białego pąka, następne co 7 dni, aż do momentu, gdy z 10% kwiatów opadną płatki korony.

**Teldor®**

**Teldor®**  
Szara pleśń.  
15 ml w 10 l wody.  
Ze względu na krótki okres karencji (1 dzień) można stosować środek tuż przed i pomiędzy zbiorami.

**Basta®\***

**Zato®**

**Basta®**  
Zwalczanie rozlogów i chwastów w miedzyrzędziach.  
Opryskiwać dwukrotnie w odstępie 10-14 dni po zbiorze owoców.  
Zalecana dawka: 40 ml/100 m<sup>2</sup> w 4 l wody.

**Zato®**  
Biała plamistość liści, mączniak prawdziwy.  
Zalecana dawka: 2,5 g/100 m<sup>2</sup>  
Środek stosować w okresie największego zagrożenia chorobami po zbiorze owoców. Nie częściej niż 2 razy w sezonie wegetacyjnym co 10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Na plantacjach owocujących przed wykonaniem zabiegów należy skosić liście i usunąć je z plantacji.

\* rozszerzenie w trakcie rejestracji

