

Warzywa

Program ochrony

Odkazanie podłoża



Zgorzele i zgnilizny



Mączniak prawdziwy



Mączniak rzekomy



Zaraza ziemniaka



Szara pleśń



Stonka, rolnice



Gąsienice



Mszyce i inne szkodliwe owady



Ślimaki



Chwasty



▶ Luty											
▶ Marzec	Previcur® Energy										Basta® Glifocyd
▶ Kwiecień			Mildex®								
▶ Maj	Previcur® Energy		Tattoo® C	Tattoo® C	Zato®						
▶ Czerwiec		Zato®		Antracol®				Decis®	Decis®	Mesuroł® Alimax	
▶ Lipiec				Mildex®			Decis®		Decis®		Basta® Glifocyd
▶ Sierpień					Teldor®						
▶ Wrzesień											
▶ Październik											

Zalecenia

Previcur® Energy
Odkazanie: 2,5 ml środka + 0,2 l wody na 10 l podłoża. środek stosować do ziemi kompostowej i innych substratów używanych do produkcji rozsady. Przynę dokładnie poleć cieczą użytkową i wymieszać.

Previcur® Energy
Podlewanie siewek lub rozsady: 15 ml/10 l wody. 2-3 l roztworu na 1 m² powierzchni. Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin. Podlewanie roślin po posadzeniu na miejsce stałe: 10-15 ml/10 l wody. 1 l roztworu na 4-5 roślin.

Zato®
Marchew, kapusta głowiasta 2,5 g w 7 l wody. Stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów.

Mildex®
Ogórek, cebula. 35 g/10 l wody.
Tattoo® C
Ogórek, cebula. 20-25 ml/100 m².

Tattoo® C
Zaraza ziemniaka 15-25 ml/100 m².
Antracol®
Pomidor: 20-25 g w 6 l wody. Ziemniak: 18 g w 2-4 litrach wody.

Mildex®
Zaraza ziemniaka, alternarioza 35 g/10 l wody.

Zato®
Kapusta głowiasta. 2,5 g w 7 l wody. Stosować z chwilą pojawienia się pierwszych objawów.

Teldor®
Kapusta (przechwalnictwo) 15 ml/7 l wody/100 m². Wykonać 2-3 zabiegi co 7 dni. Ostatni nie później niż 3 dni przed zbiorem.

Decis®
5 ml/10 l wody. Opryskiwać po zaobserwowaniu szkodnika.

Decis®
3-5 ml/10 l wody. Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych gąsienic.

Decis®
3-5 ml/10 l wody. Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika, pierwszych kolonii mszyc.

Mesuroł® Alimax
5 g/10 m². Stosować rzutowo na całą powierzchnię gleby lub wokół pojedynczych roślin.

Stosować na wyrosnięte chwasty, po siewie warzyw, lecz nie później niż 2-3 dni przed ich wschodami.
Basta®
30 ml/100 m²
Glifocyd®
15-20 ml/100 m²

